

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百四十七

詳校官太醫院院使_臣張鑑

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官中書_臣朱 鈐

校對官中書_臣范來宗

謄錄監生_臣江 晉

欽定四庫全書

普濟方卷二百四十七

明周王朱楠撰

癰疽門

總論

夫腎主納氣人之氣海繫焉腎虛而為風寒所乘而為暑濕所襲為喜怒憂恐所傷而冰結不散又與氣搏是以羣邪聚於其中曰疽曰奔曰小腸氣曰膀胱氣皆是物也其候不特外腎小腹作痛或攻刺于腰脇或遊走

于背脊或冷氣搶心心下痛滿或手足厥冷自汗嘔逆
痛遶臍膀或脇之左右如盃或臍之上下如臂或腹中
累累如桃李或胃脘間覆大如盤有壯熱惡寒者有洒
淅寒熱者有不得大小便者有裏急而下泄者自汗出
者有不欲食者其於陰間則卵有大小伸縮而上下不
常囊有腫脹急痛而發歇無定挾冷觸怒則塊物逼上
囊根或攻腹之脇時和心平則塊物自循脣系歸入囊
中凡此皆謂之腎氣治法綱領風則散之寒則溫之暑

則解其熱濕則滲其水七情所發調其心氣水與氣搏
行其小便其間以主治腎氣之劑參之然總治之法大
要以流行踈利為先毋曰腎虛得病不敢踈泄蓋腎為
邪氣所干若非逐去病何由愈儻或姑息畏虛妄以剛
劑兜住使大小腑秘而不通邪氣入腹衝心危殆必矣
然腎氣發則固以腎虛得之然虛中有冷虛中有熱又
有冷熱不調尤當詳審冷者脇邊及外腎清冷小便清
而多遇寒即發是也熱者內挾暑氣或積毒或服暖藥

於前外腎與小腹俱熱肛門間糞後赤熱小便數澀遇
熱則甚是也冷熱不調者小便外腎乍冷乍熱大便小
便或秘或利用藥溫涼當隨証而權度之但所謂流行
疎導常常運轉於其中矣其若大小便流利之後或更
有掣刺引疼或氣遊注於肌膚之間此則腎虛血虛氣
不還元當加潤養人參當歸川芎芍藥桑螵蛸葫蘆巴
輩又不可無惟是逆氣長虛中脘停酸燥悶擾甚而至
於嘔吐最為惡候何則天一生水腎實主之中筋系於

陰陰器惟藉陽明以養之今脾土不濟腎水上乘必為酸汁為必涎飲在萐踰時遂成暴吐醫家執劑之始皆知腎經惡燥如蒼朮白朮良薑之類誠不敢用及其嘔吐大作薑朮輩用之而不顧若猶未也則吳株萆萆撥剛燥等劑又加多焉雖附子亦用之而救急矣病勢至此脾土未強腎水已為之涸腎水既涸脾土又為之焦徃徃陰陽不升降榮衛不流行大小二便關隔澀閉而腎汁皆自其口出也如此者大抵不救臨病須當識病

預與病家言之夫心火下降則腎水不患其不溫真陽
不行則腎氣不患其不和安有所謂木強者哉惟夫嗜
慾內戕腎氣虛憊故陽陰不相交水火不相濟而沉寒
涸冷凝滯其間脹大作疼頑痺結硬勢所必至矣執劑
之法不可純用燥熱當溫利以逐其邪邪氣內消榮衛
流轉蓋如寒谷逢春有不戒而速不行而至者矣外此
又有一種升高墜下外腎跌傷驚起與敗血交攻亦有
木強脹疼之証治法大要則同於中更為之消瘀○大

抵諸疝之脉脉當弦緊蓋弦者寒也緊者痛也疝有七
証厥疝癰疝寒疝氣疝盤疝附疝狼疝是也何以言之
厥疝則心痛足冷食已則吐癰疝腹中氣乍滿滿氣
積如臂寒疝因寒飲食卒然脇下腹中痛氣疝腹中
乍滿減而痛盤疝腹中痛盤疝腹中痛引臍膀附疝腹
痛連臍下有積聚狼疝小腹與陰相引而痛諸疝不愈
邪氣留滯及成積聚其脉厥而緊浮而牢皆積聚之脉
也但牢強急者生虛弱急者不可治

儒門事親書云寒
疝名水疝律科王

欽定四庫全書

普濟方
卷二百四十七

敏之病寒疝臍下結聚如黃芩每發遶腰間痛急不能忍戴人先以舟車及豬腎散下四五行覺藥繞病三五次而下其瀉皆水也豬腎甘遂皆苦寒經言以寒治寒萬幸萬全但下後忌飲冷水及寒物宜食乾物以寒疝本是水故也即日病減八分食進一倍又數日以舟車丸百餘粒通經散四五錢服之利下俟三四日又服舟車丸七十八粒豬腰散三錢乃行步如常矣又一僧疝病發作冷氣上實齒下貫腎緊若繩挽兩辜時腫時冷戴人稱兩手脉細而弱斷之曰秋脉也此因金氣在下伐肝木水畏金木伸故病如是肝氣壅薄而能下榮放辜丸故其寒實非寒木受金制傳之胃土胃為陽明故上實齒病非齒之病肝木者心火之母也母既不伸子亦屈伏故下冷而水化乘經曰木鬱則達之土鬱則泄之令涌四次果覺氣和辜丸痒而暖戴人曰氣已入辜中矣以茴香木皮之藥劑以服首尾一月而愈瀉療方云治疝氣發作痛不可忍真科五苓散一貼連根葱

白一寸燈心七莖煎湯吞下青鹽木香九五十粒即效
又法青木香九二百粒斑貓七枝去頭翅為粗末用瓦
銚於文武火上同炒令木香微香却以磁碟蓋藥銚放
冷處少時去斑貓取木香九二服空心茴香酒吞下累
試之有
驗也

論云厥陰脉滑則病狐疝少陰脉滑則病肺風疝太
陰脉滑則病脾風疝陽明脉滑則病心風疝也太
陽脉滑則病腎風疝少陽脉滑則病肝風疝靈樞
經云心脉微滑為心疝引臍少腹鳴肝脉滑甚為
癰疝。夫滑脉關已上見者為大熱蓋陽與陽併

也故大熱脉滑尺脉見為大寒生癰疽滑脉者命門胞絡之名也為丙丁熱火併于下蓋丙丁不勝壬癸從寒水之化也故生癰疽寸口脉弦而緊弦即衛氣不行衛氣不行即惡寒緊則不欲飲食弦緊相搏即為寒跗陽脉浮而遲即為寒疽凡瘦人繞臍痛必為風冷穀氣不行而反下之其氣必衝心不則否。夫陰癰屬肝係宗筋胃陽明養之世多不識謂之外腎非特名義差錯亦使內臟不分其可不

辨古方四証但曰腸癰氣癰水癰卽脹殊不別其所因如腸癰則因房室過度元臟虛冷腸邊管系不收墜入癰中上下無定謂之腸癰不內外因病者久蓄憂思恐怒兼并隨臟氣下墜陰癰腫脹急痛名曰氣癰屬內所因病者久坐冷濕濕氣下襲致陰腫脹名曰水癰屬外所病者勞役無節及跨馬坐車致卽核腫脹或偏有大小上下無常者名曰卽脹亦屬不內外因有小兒生來便如此者乃宿疾也卽脹腸癰皆難治氣癰水癰治之

易愈又寒疝下注入于癰中名為狐疝亦屬癰病世人因此病以癰病為疝氣不審之甚婦人陰門挺出亦稱癰病名義不分有如此者凡癰唯腸癰無問貴賤多有之有睡卧骨系延入脇下者有隊入囊中者或遇疲勞及天色變動逼上囊根腫急作痛過於寒疝得暖則下其如外脹有作熱生膿為癰潰爛者比比有之

前陰分大寒大

熱囊垂縮陰陽別証云三陽為病發寒為癰腫不為痿厥喘瘡其傳為索罽其傳為癰疝夫熱在外寒在內則累非此九夏之氣也寒在外熱在內則外寒在內則氣也足太陽膀胱之脉逆上遮手太陽小腸之脉下行

至足厥陰肝之脉不得伸其任脉並厥陰之脉逆則如
巨川之水治陽氣下墜是風寒濕熱下出囊中至兩畢
腫大謂之曰大甚則為癰足厥陰肝之經與太陽膀胱
寒水之脉同至前陰之來傷寒家說足厥陰肝經為痛
滿囊縮急下之宜大承氣湯以瀉大熱靈樞經曰足厥
陰肝經經脉中以為寒則筋掣外縮為大寒前說囊為
大熱此說囊縮寒此說囊縮垂畢下引癰疽脚氣大寒
風濕盛下垂為寒與上二說不同以平康不病人論之
夏暑大熱囊外累垂冬天大寒急縮上與三說又大
不同何也是相乖邪不相乖邪答曰傷寒家囊外縮大
熱在內宜承氣湯急下之與筋經說囊外縮大寒在外
亦是在內與傷同故再引平康之人以証之也冬天陽
氣在內陰氣在外人亦應之故寒在外則皮急而囊氣縮
夏月陰氣在內陽氣在外人亦應之故熱在內則皮暖
皮暖則垂囊此癰疽之相也三說
文殊皆亦理也用藥詳而審之

諸疝

附論

疝病有七厥逆心痛足寒飲食則吐者名厥疝腹中氣滿心下盡痛氣積如臂者名堅疝寒飲則脇下腹盡痛者名寒疝腹中乍滿乍寒而痛者名氣疝腹中痛在臍膀者名盤疝腹中乍痛在臍下有積聚者名附疝小腹與陰相引而痛大便難者名狐疝凡此七疝皆寒由血氣凝澁不得通利冷劇則痛故皆謂之疝難經曰任之為病其內若結男子為七疝女為瘕聚蓋明此也

方

敵金散

出直指方

治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出黃水其

痛遶腸寒熱往來

荊三棱

蓬莪茂

木猪苓

白附子

蘿蔔子

赤芍藥

黑牽牛

川棟肉

山茵陳

青木

香陳橘皮

五靈芝

姜黃

茴香

南木

香

丁香

澤瀉

一兩半已上并生用

海藻

酒浸一宿焙乾

海浮石

米醋浸火煨紅淬如此七次黑為度

川山甲

熟火灰煨

青皮

去白

二兩生用一兩截碎以班貓五十箇頭翅去足同炒黃色去班貓不用

香附

杵淨三兩一兩

生用一兩以巴豆五十粒去壳同炒色焦去巴豆不用

右截碎夾和微炒並為末酒麴稀糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒送下此藥泄斟酌用之

又方

川棟散

出直指方

治外腎脹大麻木痛硬及奔豚疝氣偏墜

諸証

川棟子

不蛀者四十九箇先切七箇取肉以茴香二錢慢火同炒併留茴香又切七箇以破

故紙二錢半同炒併留故紙又切七箇以黑牽牛
二錢半同炒併留牽牛又切七箇以鹽一錢同炒
併留鹽又切七箇以斑貓十四箇去翅同炒去班
貓不用又切七箇以巴豆肉十四箇作兩斷同炒
去巴豆不用又切七箇蘿蔔子一錢
半同炒去蘿蔔子不用外更別分入
茴香炒青木

香各半桂心南木香各二錢
兩半夾和

右為末酒調麵糊丸如梧桐子大每服三十丸食前
鹽酒下積日計功打墜瘀血一方加延胡斑牛半兩
畧炒入藥研末調酒下

療疝氣核腫疼

方見本門諸
癰類黃耆丸

消疰丸

出楊氏家藏方

治寒在下焦臍腹掣痛膀胱重墜久而

不愈漸至腫大甚者生瘡時有濃汁焮硬赤痛不忍者

金鈴子

去核炒黃

赤撲兒

焙

茴香

炒稱三味各二兩

肉桂

去皮半兩

甜瓜子

微炒一兩

右件為細末酒煮麵糊為丸如桐子大每服五十丸至一百丸空心溫酒或鹽湯下忌熱麵生葱大酢粘食等物

川椒散

出直指方

治疝氣外腎腫痛

川椒

去目并合口者微炒出汗

官桂

各半兩

白苳仁

甘草

各一兩

川芎

當歸

青皮

陳皮

製

枳壳

檳榔

赤

茯苓

青木香

南木香

萆澄茄

右為麝散每三錢薑棗煎食前服

疾藜丸

出三因方

治囊核堅大行動難發作牽連偏墜疼痛

白蔞藜

微炒去刺

海藻

浸洗去鹹

澤瀉

各一兩

茴香

炒一兩半

桂心

牛膝

剉酒浸

五味子

木香

煨

檳榔

各二兩

茯神

人參 遠志

水浸去心姜汁炒各三兩

川練

去皮核麩炒

桃仁

去皮尖炒

別研 赤芍藥

續斷

山茱萸

茯苓 酒浸

青皮 各四兩

右為末蜜丸梧子大空心食前溫酒鹽湯下三五十

丸

海蛤丸

出濟生拔萃方

治癰疽

地膽

二十一箇去頭足翅

海蛤

醋淬三遍

當歸

海金沙

膩粉

硃砂

各一錢

海藻

粉霜

各半兩

水蛭

二十箇炒

青黛

滑石 乳香

各一錢

朱砂

二錢為末

右為末鹽湯麵糊為丸如小豆大朱砂為衣每服十丸煎燈草湯空心服之小便下冷濃惡物乃效却以黃連紫河車板藍根各三錢煎湯嗽口以手刷齒一方去板藍根加管仲

椒薑丸

治七疝諸寒在臍傍痛上又胃中滿少氣

蜀椒

去目及閉口炒出汗一兩一分

乾薑

炮

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙

黃芩

去黑心

細辛

去苗果

芍藥

桂

去皮各一兩

桔梗

炒半兩

烏啄

炮裂去皮臍一分

柴胡

去苗

白茯苓

去黑皮

牡丹皮

各一分

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十丸溫酒或米

湯飲下日三服

聚香飲子

出危氏方

治七情所傷遂成七疝心腹脹痛腰脇

連背不可俛仰

檀香

木香

乳香

沉香

合香

各一兩

玄胡索

炒去皮

片子姜黃

川烏

炮去皮尖

桔梗

去蘆剉炒

桂心

不見火

甘草

炙各半兩

丁香

亦不見火一兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜七片棗一枚煎七

分去滓溫服不拘時

厚朴丸

治七疝肢體寒臍腹堅痛滿痛

厚朴

去皮生
姜汁炙

附子

炮製去
皮臍

懷香子

炒

白朮

剉桂
皮去

乾姜

炮

枳殼

去瓢
麩炒

青橘皮

湯浸去
白焙

芳藟

炮製去
皮臍

烏

頭

炮
木香

當歸

切焙各
一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下生姜湯亦得不拘時

海藻丸

治奔豚疝氣膀胱小腸氣頑卵木腎及小兒

偏墜一切腎氣等症

海藻

半兩洗焙乾

木香

檳榔

川椒

去目炒

甘遂

各半兩

川烏

半兩炒小兒去之老人用一兩

白牽牛

二兩取末半兩

黑牽牛

二兩取末

半兩 茴香

微炒

猪苓

去皮

澤瀉

各三錢

吳茱萸

四錢椒炒

右為末滴水丸如梧桐子大每服五十丸至百丸空

心鹽湯酒任意下黃涎下者驗十五歲以下小兒二

十五至五十丸此藥不特利大便大能利小便後復

忌甘草相反

烏頭丸

出聖惠方

治七疝氣臍腹堅痛

川烏頭

炮製去皮臍

蓬莪茂

木香

川大黃

剉碎微炒

當

歸

芎藭

荊三棱

炮剉

川椒

去目及閉口者炒出汗

桂心

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

乾漆

搗碎炒令烟出各一兩

肉苳蔻

半兩

去壳

右為末先以釀醋一升入藥末四兩熬令減半又漸入醋一升熬成膏次入餘藥末和搗三百杵丸梧桐子大每服食前生姜湯或煖酒下二十丸

草荳蔻丸

出聖惠方

治七疝四肢寒冷臍下妨痛不欲飲食

草荳蔻

去皮

厚朴

去粗皮生薑汁炙令香

附子

炮裂去皮臍

懷香子

微炒白朮

桂心

乾姜

炮各一兩

青橘皮

湯浸去白穰焙

芳藟

川烏頭

炮製去皮臍

木香

吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒各一兩

右為末煉蜜為丸和搗三二百杵丸如梧桐子大每服於食前熱酒下二十丸

白朮妙功丸

出御藥方

治腎氣久虛上攻下注臍腹久冷腰

背痲痛及膀胱疝氣玄癰氣悶小腸作聲時時下墜

白朮

莪朮

澤瀉

當歸

去蘆頭

厚朴

去皮生薑汁炒

破

故紙

炒各半兩

延胡索

木香

共二錢

川苦楝

檳榔

各三

錢

右為末水煮麵糊丸如荳大每服七十丸食前溫水

下

宣胞丸

治膀胱疝氣及豚木腎其大如斗

猪胞

黑牽牛

四兩入胞內好醋一升煮至盡焙乾

木香

木猪苓

去皮續隨子

淡豆豉

三棱

煨

川楝肉

馬蘭花

茴香

炒各等分

右為末糊丸如梧桐子大每服五十丸鹽湯第二服
車前子湯下小便實閉不通加土狗十箇海金沙一
兩

蓬莪茂丸

治七疝臍腹堅痛

蓬莪朮

炮

木香

大黃

剉

當歸

切

芎藭

荊三稜

炮

草豈薳

去

皮桂

去

桃仁

去

皮尖仁

炒各一兩

肉豈薳

炮

半

乾

漆

炒令烟

出一兩

右為末醋麵糊為丸梧桐子大每服二十丸溫酒或
生姜湯不拘時

茴香棟子丸 治諸疝症

川棟子

一兩
三錢

小茴香

一兩
半

吳茱萸

二兩

海藻

一兩

澤瀉

半兩

青鹽

三錢

蓬朮

七錢
半

三楞

七錢
半

黑牽牛

七錢
一兩
半
生用
一半炒用

右為細末醋糊丸梧桐子大每服五十丸空心酒下
前川棟茴香茱萸用酒煎童子小便各浸半兩又用

巴豆去皮班猫去翅足各三五箇以川練苗香青皮
共炒色變去班巴二藥

烏啄丸

治疰諸寒臍膀痛上攻胃中滿悶少氣

烏啄

炮製去口皮臍

厚朴

姜製

赤茯苓

梧櫚

各半兩

乾姜

炮

木香

細辛

芍藥

桂心

川椒

去目及閉口者微炒出汗

柴胡

去苗共一兩

右為末煉蜜和搗三百下丸梧桐子大每服食前溫
酒下十五丸

吳茱萸丸

治七疝氣心腹結聚疼痛

吳茱萸

湯浸七次
焙乾微炒

木香

檳榔

訶黎勒

煨用皮

川

大黃

赤茯苓

烏啄

炮去
皮臍

當歸

赤芍藥

枳

壳

麩炒
黃

桂心

各一
兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食前熱酒下二

十丸

狼毒丸

治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬疼痛

不已

狼毒炒

芫花

醋炒

川烏

各一兩

椒紅

炒

乾姜

炮

乾漆

炒

烟

盡三稜

鱉甲

醋炙

沒藥

各半兩

全蝎

去毒

九箇

右為末醋糊丸如梧桐子太每服四十丸空心酒下

或姜湯甚者炒鹽半斤令熟以故帛包熨痛處

十補丸

治大小腸寒疝膀胱伏梁奔肭瘕氣等疾亦

治婦人育腸氣

附子

一兩用防風一兩剉如黑豆大鹽四兩黑豆一合炒附子製去諸藥只用附子去臍皮

葫蘆巴

木香

巴戟

去心

川楝子

炮去

官桂

延

胡索

萆澄茄

舶上茴香

炒

破故紙

炒已上九味共一兩

右為末糯米粉酒打糊丸梧桐子大辰砂為衣每服
三五十丸空心酒下婦人醋湯下若入益智子亦得
杜夷之苦此歲久醫三年百藥不效後用此數服去
根却以獻繼先亦有此疾服之亦安葛司理尊人倅
金州以授同官蘇主管亦用此方屢效

蠲痛丸

治小腸膀胱氣痛

延胡索

煨炒一兩

川練

蒸去皮核

舶上茴香

炒各半兩

牽牛

炒取末

當歸 青皮 去白木香 各一分 全蝎 七箇 天台烏藥 用

分良姜

右為末生薑自然汁浸糕為糊丸梧桐子大每服三十丸燒綿灰存性調酒送下

狐陰丸 方見本門陰癩類 療腎虛疝氣腰膝冷疼陰囊腫癢

神效丸 治疝氣

芫花 醋浸炒 木香 梅榔 三稜 各半兩炒 茯苓 青皮

全蝎 附子 炮 硃砂 官桂 各二錢半

右將硃砂用水浸磁蓋內沉去泥土留湯瓶頭頓成膏子糠醋打糊為丸如菴豆大每服三十丸空心溫酒下

當歸四逆湯 治男子婦人疝氣臍腹冷痛相引腰膝而疼

當歸分七附子炒官桂 茴香炒柴胡各五分芍藥

玄胡 川棟子 茯苓各三分澤瀉二分

右為麤末都作一服水煎空心服

桂姜湯

出直指方

治無陽臍冷疝氣兼治濕症

吳茱萸

酒醋浸一宿焙乾

川白生姜

辣桂

各半兩

良姜

萆澄茄

茴香

炒

縮砂仁

益智仁

木香 茯苓

苓 甘草

炙各三錢

右判每服三錢水煎調蘇合香丸食前服

茴香棟實丸

出衛生寶鑑

川棟子

炒

茴香

炒

山茱萸

食茱萸

吳茱萸

青皮

陳皮

芫花

醋炒

馬蘭花

醋炒共一兩

右為末醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下
食前量虛實加減以利為度

沉香蒺藜丸 治小腸癰疔偏墜等疾

沙苑蒺藜

酒炒

防風

各一兩

葫蘆巴

酒炒

茴香

炒

金鈴子

末地龍

去土

牡丹皮

各半兩

沉香

萆澄茄

末香

各二

分

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服四五十丸鹽湯
溫酒任下久服除根

川椒丸

出聖惠方

治七疝忽心腹氣逆不得息痛引背脅或

臍下堅痛遇冷即極若小腹虛滿引膀胱裏急

川椒

去目及閉口者微炒出汗

厚朴

去粗皮塗生姜汁炙令香熟

栝榔

各一兩

桔梗

去蘆頭

細辛

赤芍藥

乾姜

炮製

附子

炮製去皮

臍

川烏頭

去皮臍炮製各半兩

右為煉蜜和丸梧桐子大每食前生姜橘皮湯下二

十丸

治疝氣

川棟子

二十一箇內七箇用海金沙二錢炒去沙七箇用班貓虫二錢炒去七箇巴豆二錢

炒去

舶上茴香

炒

木香

黑牽牛

頭末

破故紙

炒

葫

蘆巴

炒

烏藥

去心

玄胡索

各半兩

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心鹽

湯下

丁香練實丸

出醫方大成

治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚

帶下皆任脉所主陰經也乃腎肝受病故治法同歸于一錦文大黃一兩為細末用釀醋好者半升同煎

成膏

當歸

去蘆

附子

炮製去皮臍

茴香

川楝子

各一兩

右剉細用好酒三升同煮酒盡為度焙乾作細末每稱藥末一兩入下項藥

丁香

木香

玄胡索

五錢

全蝎

十二箇

右為末入在前項藥內拌勻酒糊為丸梧桐子大每服三十丸加一百丸空心溫酒送下凡疝腎氣帶下皆由於風全蝎治風之聖藥茴香川楝子皆入小腸

經當歸玄胡索和血止痛疝氣帶下皆積陰邪入小

腸之間故以附子佐之丁香木香引道也

韓提控疝病每發痛

腎不可忍則于兩末各直其枕往來服之以受如是者三年不已服此藥三劑良愈

透經散

出百一選

治下部諸疾

川棟子

一兩剉炒入巴豆二十粒吳茱萸一兩同炒焦赤色去豆茱萸

茴香

炒沉

香胡椒

全蝎

炒各半兩

縮砂

二兩連皮炒燥去粗皮用

木香

一兩

不見火

玄胡索

二兩新瓦上炒

右為末每服二錢食前酒調下

天台烏藥散

出衛生寶鑑

治小腸疝牽引臍腹疼痛

烏藥

木香

茴香

炒

良姜

炒共五錢

枳榔

二個

川楝子

十箇巴豆

十七箇

青皮

半兩

右先以巴豆打破同楝子用麩炒俟黑色去巴豆麩不用外為細末每服一錢溫酒調下痛甚炒生姜熟酒下亦得

桃仁湯

治療疝氣

桃仁

去皮尖及双仁

吳茱萸

橘皮

海藻

生姜

茯苓

苓 羌活 蒺藜子

去角各
三兩

右切以水三大升煮取九合分為三服空心服忌酢物

七疝丸 主暴心腹厥逆不得氣息痛連背脅名曰尸疝
疝下心堅痛不可手迫名曰石疝臍下堅痛得寒冷
食輒劇名曰寒疝脇下堅痛大如手痛時見若不痛
時不見名曰盤疝臍下結痛女人月事不時名曰血
疝小腹脹滿引膀胱急痛名曰脉疝悉主之

椒

出四兩
汗

桔梗

芍藥

乾姜

厚朴

炙

細辛

附

子

炮各
二分

烏頭

一分
炮

右為蜜丸如豆大三丸加至七八丸日三服忌豬肉

冷水生菜方用溫酒送下

荔枝丸

出德
生堂

治疝氣陰核腫大痛不可忍

荔枝核

十四箇新者
燒灰存性

沉香

木香

青鹽

食鹽

八角茴香

炒共
一錢

小茴香

川楝子肉

各二
錢

右為細末每服三錢熱酒調空心服

益智仁湯

治疝氣痛連小腹攣搐叫呼不已診其脉

沉緊是腎經有積冷所致

益智仁

乾姜

各半兩

甘草

炙

茴香

炒各二錢

烏頭

炮去皮

生姜

各半兩

青皮

去白二錢

右㕮咀每服四錢水二盞入鹽少許煎七分去滓空

心食前溫服

立效散

治疝氣

川芎

川棟子

青皮

去白

茴香

舶上者

黑牽牛

炒

桃

仁 各一
兩

右為末酒煮麴糊為丸梧桐子大每服十五丸空心

葫蘆巴丸 治大人小兒小腸氣蟠腸氣奔豚疝氣

偏墜陰腫小腸如卵上走痛不可忍或後結遶臍故

刺嘔惡悶亂並治之

葫蘆巴炒一斤 吳茱萸湯洗七次炒十兩 大巴戟去心炒 川烏

炮去皮臍共六兩 茴香洗去土炒一十二兩 川楝子炒一斤二兩

右為末酒煮麴糊為丸梧桐子大每服十五丸空心

溫酒吞下小兒五丸茴香湯下一方加牽牛

川棟散 治膀胱小腸臍下撮痛上衝心腹下引足膝

夜多旋溺外腎騷癢面色痿黃脚下癰痛四肢倦怠

不思飲食

破故紙炒川楝子

蒸去皮核

茴香

炒各四兩

葫蘆巴

酒浸炒三兩

乾姜

炮一兩

附子

炮去臍一兩半

右為末每服二錢空心熱酒調下食前

硃砂丸 治諸疝作痛

木香

沉香

巴豆肉

全者各一兩

青皮木

去皮二兩

銅青

半兩
兩硃砂二錢半製
如前研

右以二香青皮三味細剉同巴豆慢火炒令紫色為度去巴豆為末入皮砂二味研勻蒸餅和丸梧桐子

大每服七丸至十丸鹽湯吞下空心日進二三服

神聖代針散

治一切厥心痛小腸疝氣痛不可忍及

心驚欲死及小腸氣擋得如弓角膀胱腫硬一切氣

刺虛痛婦人血刺衝心阻一切痛楚服之大有神效

孕婦勿服

蛭蜻

一兩即斑猫虫用糯米一兩水洗淨即取出俟乾用蜻一處微火炒米黃色

製去屑為末

乳香

別研

沒藥

別研

當歸

白芷

川芎

各半兩

右為極細末和勻每服一字甚者二字藥如小錢一字上多先點好茶一盞次糝藥末在茶上不得吹攪立地細細呷之又治胎衣不下難產

消疝丸 治下部

蒼朮

二兩

茴香

鹽炒

玄胡

各一兩

牽牛

半兩

木香

一兩

川東

錢

半兩用巴豆二箇不
要碎炒黑不用豆

右為末酒糊為丸一半用酒送下一半病發時酒調

送下丸子

芫花丸 治七疝臍腹堅硬時有疼痛

芫花

醋拌炒
令乾

乾姜

炮製去
半兩

川烏頭

炮製去
皮臍

青橘皮

湯浸去
白瓢炒

附子

炮製去皮
臍各一兩

巴豆

三七枚去皮心研
如膏紙裏壓去油

右為末入巴豆膏都研令勻醋煮麵糊為丸如菴豆

大每服食前酒下三丸

治疝氣

官桂

半兩去粗皮

蛇床子

一兩半

柴胡

細辛

白芷

各二

兩

右咬咀每服五錢大水二升葱白和鬚二莖椒五十粒同煎七分於瓶口上熏令微汗出再暖通手洗婦人帶下赤白熏之亦效婦人用可加紫蘓一握

又方

大蒜

二箇

韭菜

一握

蘼菜

一握

右用大沙瓶內口煎令百沸乘熱熏之俟入得手則洗之如冷則再暖二次立效

茴香散 治寒濕氣入小腸疼痛或外腎腫痛

茴香一兩 川棟子肉炒 破故紙炒 香附子 猴查子

各半兩
去核

右為末每服二錢空心溫酒鹽湯任意調下日三服
初生小兒皆可服如藥冷將盞盛藥於熱湯內坐熱
塗母乳與喫男子是小腸氣女兒是盤腸氣

木香棟子散

出瑞竹堂方

治小腸疝氣膀胱偏墜久患藥不

效服此

川棟子

三十箇為末末研前先用練子炒黃赤色去巴豆不用

單薛

半兩

石菖蒲

炒一兩

青木香

炒一兩

荔枝核

二十箇炒

石為末每服二錢重入麝香少許空心炒茴香鹽酒

調下神效

安息香丸

一名煉陰丸

治陰氣下墜腫脹外核偏大堅硬如

石痛不能忍

玄胡索

微炒
去壳

海藻

洗

昆布

洗

青皮

去皮

茴香

炒

川楝

子

去核

馬蘭花

已上共
一兩炒

青木香

半兩不
見火

大戟

酒浸三
宿切片

焙乾共

二錢半

右為細末另將硃砂真阿魏安息香三味各二錢半
用酒一盞醋一盞將硃砂阿魏安息淘去砂石用醋
酒各一盞熬成膏子再入麝香一錢沒藥二錢半俱
各別研細入前藥一同和丸如菉豆大每服十丸至
十五丸空心用綿子灰調酒送下

牡丹丸

出存仁方

治風寒疝痛及諸血滯作痛

牡丹皮

四兩

桃仁

浸去皮尖別研

官桂

各五兩

川烏頭

一隻炮熟去皮

尖

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸溫酒下血痛醋湯下一方酒糊丸一名消堅丸

四聖散

出瑞竹堂方

治小腸膀胱疝氣痛不可忍者

川楝子

炒黃

胡椒

茴香

炒

全蝎

炒各半兩

右為末每服二錢空心熱酒調下

四神丸

出直指

治腎冷疝氣脹痛不已

吳茱萸

揀淨一兩一半用老酒浸一宿焙乾

大香附子

淨

一兩 萆澄茄

青木香

各半兩

右為末米糊丸梧桐子大每服七十丸空心鹽湯吞

下或乳香葱白煎湯下亦可鹽酒尤妙

香牛散

一名香壳散出仁存

治外腎腫痛小腹疝氣

茴香

一兩炒

黑牽牛

半兩

玄胡索

枳殼

並炒共半兩

右為末酒調二錢空心下一方加吳茱萸葫蘆巴各

半兩效

四聖散

出仁存方

治小腹疝氣引外腎痛腫

茴香

炒

川山甲

全蝎

南木香

右等分為末以酒調二錢一服便住痛妙甚

沙參丸 治疝氣

沙參

二兩

昆布

洗出鹹焙

懷香子

炒各兩半

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸空心

食前溫酒下

如聖丸 治男子五種疝氣婦人產前產後惡物不行

臍腹撮痛並皆治之

地膽

三十二箇
去頭足

斑猫

五十箇
去頭翅足

鹽豉

七十箇

輕粉

半錢

為衣

右以上四味用棗肉丸如菉豆大每服五十丸先飲好酒三五盞後用溫酒下如重車行五里小腹微覺痛小腹勿驚無妨取下胞中病如雀腦相似是病根又治婦人產後臍腹痛惡物不盡服七丸童子小

便下立效又治男子婦人絃氣并小腹臍痛每服一
丸溫酒送下婦人用童子小便下立效又治小腸疝
氣及婦人產前產後經絡不來赤白帶下經絡不止
忌食雜魚濕麵雞豬馬牛等肉

金鈴散

一名川棟茴香
散出經驗方

治小腸膀胱腎大外腎腫大下

塞不通

川棟子

十箇每箇作四
片鹽炒同鹽用

舶上茴香

鹽炒香不用鹽
與川棟子木香

各等 巴豆

五粒連壳打破用川棟子微
火炒川棟紫色去豆不用

木香一分

右為末每服二錢用好酒一盞連根葱一寸同煎令葱熟去葱調藥末頓服空心下三服許學士云大抵此疾因虛得之不可以虛而驟補經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實故必滌所蓄之熱然後補之是以諸方多借巴豆氣者也

治疝氣

乾姜

炮製

良姜

陳皮

青皮

各三兩

右碾為末米醋糊丸如梧桐子大每服六七十丸空

心酒送鹽湯亦得比吞丸子前嚼小茴香一撮然後
送下丸子日進三服空心便服

治寒濕氣入小腹疼痛或外腎腫痛

出經
驗方

高良姜

山梔子

鬱金

各半
兩

右為細末空心葱湯調下服二錢

玄附湯

出存
仁方

治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大

便滑泄

玄胡索

炒去
皮

附子

炮去皮臍
各一兩

木香

不見火
半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜七片煎七分去滓
溫服不拘時

川楝子丸 治一切下部之疾悉皆治之腫痛縮小雖
多年服此藥永去根本

川楝子

一斤淨肉四兩用麩炒一合班猫四十九
箇同炒麩黃色為度去麩班猫不用四兩

用麩一合巴豆四十九粒同炒麩黃色為度去麩
不用巴豆四兩同麩一合巴戟一兩同炒麩黃色
為度去麩巴戟用四兩用鹽一兩茴香
一兩同炒黃色為度去鹽茴香不用
木香 一兩
不見

火破故紙

一兩炒
香為度

右為細末酒糊為丸梧桐子大每服五十丸鹽湯下
甚者日進三兩服空心食前服

禹功散

黑牽牛

頭末四兩

茴香

炒一兩

或加木香

一兩

右為末生姜自然汁調三錢卧時服

七疝湯 治男子七種疝氣攻疰小腹急痛牽掇不可

忍者

川烏

炮去臍皮半兩

全蝎

十四箇去毒炒

鹽

三錢炒

右呔咀水一碗姜七片煎七分去滓放溫只作一服
空心食前服一方無姜

凡諸疝氣偏墜舉發者氣實大便閉可用生料五苓散
加茴香吳茱萸炒鹽少許每服五錢重水一盞半燈
草二十根煎七分去渣送下青木香五十九丸通利其
氣虛大便滑泄者可用蠡蔥散加吳茱萸小茴香鹽
炒煎一服送下走馬茴香丸或內消丸五十九丸空心
服之予用此藥多驗

防風散

一名牡
丹散

治疝氣腫硬癰偏大腸不能動坐卧不

安

防風

去
蘆

牡丹皮

去心各
等分

右為末食前酒服方寸七日三服治癰卵偏墜一方
加黃蘗桂心二味等分治氣上下痛腫用桂心豉鐵
精等分為五味小兒一刀圭二十日愈嬰兒以乳汁
和大豆許與之

葫桃散

葫蘆巴

桃仁

去皮
炒

右等分為末酒調二錢食前服

去鈴丸

治奔豚疝氣或陰囊腫大

川烏尖

七箇
生用

巴豆

七枚
去皮只
去丸分油

右為末糕糊丸如梧桐子大用硃砂麝香為衣每服
三丸同青木香丸三十粒空心冷鹽酒下三兩一服
不可多

神應散

治諸疝心腹絞痛不可忍

玄胡索

胡椒

等分

右為末每服二大錢酒半錢小蓋半煎七分食前溫服一方百沸湯調服

香沙丸

茴香

鹽炒香去
鹽不用

新蚕

晒乾各
等分

右為末煉蜜丸如彈子大空心細嚼溫酒送下甚者日進二服

桃仁膏

方見本門
小腸氣類

治疝氣膀胱小腸氣痛不可忍

治大人小兒偏墜

防風

官桂

辛辣者

右等分為末每服二錢溫酒調下如服訖以食壓之

又方

荔枝核

冬橘核

右燒存性為細末溫酒調下一錢

二物湯 治奔豚疝氣攻刺走痛

辣桂

一兩半

牛

一兩炒

寸金丸 治奔豚諸疝作痛

當歸 延胡索 舶上茴香 炒 葫蘆巴 炒各 桃仁

浸去皮焙 桑螵蛸 酒蒸 川五靈芝 別研 白芍藥 川棟肉

各半 萆澄茄 木香 二錢 全蝎 十箇

右為末醋打麵糊丸梧桐子大每服五十丸少鹽入酒送下有熱小便閉車前子赤茯苓煎湯下

治丈夫本臟氣傷膀胱連小腸等氣

右金鈴子一百個溫湯浸過去皮巴豆二百個槌

微碎麩二升同於銅鍋內炒金鈴子赤熟為度放
取出麩核為末每服三錢非時熱酒醋湯調並得
其麩巴豆不用也棟實即金鈴子

治疝氣

炭皮一兩茴香半兩

右炒為末作二服酒調熱服汗出即愈又香白蔥芷

末酒調服

五苓散

出危氏方

治撮聚疝氣

用連根葱白二寸燈心寸莖鹽炒茴香一撮川棟

子三個去核煎湯調下大効

又方

出經驗良方

吊治小腸膀胱痛腎痛外腎腫大

用礞砂仁為細末每服二錢嚼煨葱熱酒調下不

拘時

川棟散

出經驗良方

治小腸氣膀胱氣痛不可忍

川棟子

一兩每個切作四片

青皮

湯浸去白切焙乾稱一兩

木香

二兩舶上

茴香

一兩巴豆

五十個去壳不出油

右一處炒令黃色去巴豆不用再入海金沙一錢桂
府滑石一錢半同杵細末每服一錢煎葱白酒熱下
治本臟氣

用鷄心枳榔小便濃礪半個服或用熱酒調一錢
七

金鈴子散

出濟生方

治七疝寒注下焦小腹引外腎疼痛大

便多閉血疝

川楝子

去皮核取肉一兩用巴豆七枝去壳同炒令黃色去巴豆

右為細末每服二錢熱鹽酒調服空心食前一方用
川棟七個炮空心酒調下屢效

治疝氣小腸偏墜等疾已驗神效

一方五苓散朱端嘗
病疝氣親服神效傳

之數人無
不驗者

右以先服五苓散用酒半盞燈心棗煎下青木香丸
一二十丸次服煨姜鹽煎五積散俟平復再服沉香

及葷澄茄散四藥

出百一
選方

蝎麝散

出直
指方

治膀胱小腸氣痛

右用全蝎緊實而全者不拘多少焙乾為末每逢病欲發時用蝎末一錢入麝半字分作二服溫酒調下候如人行十里又進後服神效

通治荊芥散

出經驗良方

治風疝陰腎腫大兼治陰囊腫痛

凌醫云曾以治人有驗

右用荊芥穗不俱多少新瓦上焙為末每服二錢以熱酒下即散

治膀胱疝氣

右須以青木香丸每服五十丸用醇酒入葱白濃煎五苓散送下一方不用酒以葱燈心煎湯下

治風疽疔氣腫墜凝血及瘰癧除濕風

出本草

右用茵草為末和入湯服

懷香子散 治小腸膀胱疝氣疼痛

懷香子

炒

荊三棱

煨剉各一兩

姜黃

馬蘭花

醋炒各半兩

沒藥

研

乾姜

炮各一兩

右為散每服二錢空心食前熱酒調下

治偏墜

右以每日早煎香蘓散入少鹽服之即愈

治卒得諸疝小腸及陰中相引痛如絞自汗出欲死

右以搗過沙參末篩薑湯調服方寸匕立瘥

消腎丸 治腎大小便疼痛

右用橘皮揀淨二兩巴豆十四粒同一處炒至橘皮
及巴豆黑色去巴豆用橘皮炒末二兩又黑牽牛二
兩合同一處醋糊為丸梧桐子大每服三四十九漸

漸加五十丸鹽酒湯下鹽湯亦可食前

淋瀝藥方

出百一選方

蛇床子 川椒 木通 石茱萸 藜蘆 陳橘

皮

各一兩

右為末每用連根葱白七枚水三碗藥二匙煎五七沸先噓俟通手淋洗

氣寶丸

出楊氏家藏

治一切氣滯心胸痞悶及酒食所傷脾

胃積滯膀胱氣攻注腰脚

茴香

炒稱二兩

陳橘皮

一兩

木香

一分

黑

牛

二兩

以吳茱萸

二兩慢火

同炒俟茱萸焦取出不用

茱萸只用牽牛頭末一兩

右為細末拌勻煉蜜為丸梧桐子大每服二十丸至

三十丸生姜湯下更看虛實加減食前服小腸氣痛

鹽湯下

治寒濕氣小腹疼外腎便大腫痛發時只一兩服立定

常服此藥無下部之疾

出百一選方

茴香 柿榲子

本草名糖棗惟滁州者入藥二味共等分

右為細末每服一錢或二錢鹽湯調空心熱服

二神膏

出經驗良方

治腎囊偏墜疝氣

牡蠣

二兩煅

良姜

一兩

右為細末津唾或水調服大便處須臾如火熱畧痛

即平安

隻金丹

出危氏方

治男子疝氣小腸虛損

小茴香

二兩

濕生虫

陰乾二兩

右為末酒糊為丸梧桐子大每服三五十丸空心茴

香湯下

海藻丸

出危氏方

治偏墜小腸氣

海藻

海帶

各一兩

班猫

二十八個去翅足

巴豆

二十八個去壳完全

者

右巴豆班猫二味一處生絹袋盛用好醋一碗以瓦盛四味同煮將乾去班猫巴豆不用只將海帶二味細研為末以淡豆豉一百粒以煮藥餘醋畧浸蒸研為膏和末藥為丸如梧桐子大每服用麝香少許硃

砂三錢乳鉢內細研至無聲却入麝香再研勻為衣
日乾以新瓦瓶收之每初服七粒二服十粒三服十
五粒若未愈再進三兩服皆用十五粒仍用鹽炒茴
香細嚼酒吞下空心服忌鴨子并酢醬動氣等物久
病三五服效此藥貴新合效速若合下稍久多服為
佳

牡丹五等散 療癰疽疔偏大有氣上下脹大行走腫
大服此良驗

牡丹皮

防風

黃蘗

炙

桂心

共一分

桃仁

皮尖研

右為散以酒服一升圭二十日愈少小癰疽最良小

兒以乳和如一大豆與之長宿人服方寸匕忌生葱

胡荽

金穀散

出楊氏家藏方

治疝疼痛淋瀝下部

穀精草

枇杷葉

各兩半

鬱金

一兩

右件咬咀每用一兩半水五升煎數沸乘熱熏之去

滓通手淋洗

黑神散

出聖德堂方

治男子婦人膀胱痙瘕七疝下氣五隔

氣疾產後諸血漏下赤白腹中有塊大如杯捲血痙瘕七疝發時痛不可忍者用之效

乾漆

六兩半生用一半重湯煮半日

神麴

炒

小茴香

炒共半兩

木香

椒紅

去白

丁香

共半兩

檳榔

四個大者已上除椒餘藥一半生用一半同炒

右為細末水糊為丸如彈子大別研茴香末十二兩鋪陰地陰乾俟外乾並茴香同丸藥收入甌內盛極乾去茴香凡腎氣膀胱痙瘕七疝下墜五隔血崩產

後諸血漏下赤白者用藥一丸分作四服細嚼酒下

死胎者用一丸燒綿子灰酒調下難產者用冬葵子

四十丸粒杵碎煎酒下

應痛丸

出三因方

治敗精惡物不去結在陰囊成疝痛不可

忍久服去病

阿魏

三兩醋和用蕎麥麵作餅厚三指累阿魏慢火煨熟

檳榔

大者二個刮去窠子蒲成

的乳香將刮取末用

蕎麥麵

伴作餅子慢火煨熟

右同研為末入硃砂末一錢赤芍藥一兩同為麵糊

搜和丸如梧桐子大溫酒鹽湯下十丸至二十丸食

前服

止痛丸

出楊氏家藏

治疝氣小腸並婦人血氣痛不可忍者

芸臺子

一兩

班貓

去翅足四十九枚二味一處慢火炒深黃色勿令焦揀出班貓四十

二枚只用七枚

右件為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服一丸

小腸氣炒茴香酒下血氣炒生姜醋湯下

茴香蒼朮丸

出德生堂經驗方

治疝氣偏腎核墜不能忍者

蒼朮

一斤泔水浸春夏三日秋冬五日

破故紙

鹽炒

八角茴香

鹽炒巴

戟

出心

黑牽牛

各二兩

右蒼朮分作四分與四藥合炒外杜仲四兩炒去系
止去黑牽牛不用餘為末酒糊為丸梧桐子大每服
五十丸空心鹽酒水任下

茯苓桂甘湯

出直指方

治臍下悸動欲作奔豚

茯苓

二兩

甘草

炙半兩

桂枝

一兩

右剉細每服四錢棗一個用泉水一盞半煎一盞溫

服

內消丸

出楊氏家藏

治小腸膀胱疝氣下部等疾

木香

茴香

沉香

硫黃

別研

附子

炮去皮臍各半兩

礪

砂

二錢別研

全蝎

四十九枝炒

右件為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服七丸綿

灰溫酒送下食前

必效丸

出楊氏家藏

治偏墜膀胱疝氣小腸氣痛不可忍者

桃仁

半斤用茱萸四兩炒桃仁令紫色去茱萸令碾桃仁為細末却入和後諸藥

茴香

炒

破故紙

炒香熟二味共二錢

延胡索

穿山甲

用蛤粉炒赤色

地

蟾蟲

洗去泥土頭翅足焙乾三味各一兩

右件為細末麵糊為丸梧桐子大每服五丸空心溫湯送下仍用前件炒藥茱萸炒為細末用津液調敷患處

丁香疝氣丸

出詩效方

治臍下撮痛疼並臍已下周身皆急

小便頻清其五脉急獨腎按之不急皆虛無力名曰腎疝

當歸

茴香

共一錢

甘草

木香

共五分

全蝎

十三個

羌

活

三錢

防己

三分

麻黃根

玄胡

各一分

丁香

半錢

肉桂

一錢

川烏頭

半分

右件為末酒煮麵糊丸如雞頭仁大每服五十丸溫

酒送下鹽湯亦得空心服

應痛丸

出楊氏家藏方

治疝氣痛甚者

胡椒

三百二十粒

巴豆

七枚去壳

班貓

二十一枚去頭足翅用

右件為細末煨蒜為丸如菉豆大每服三丸溫酒或

熟水送下食前空心服或痛時便服

衛生寶鑑 癸丑歲奉詔至六盤山上命治火赤紐隣
久病疝氣復因七月間飢飽勞役過度縱飲所發甚至
面色青黃不澤腹臍陣痛擗撮不可忍腰曲不能伸熱
物熨之稍緩脉得沉小而急余因思難經有云任之病
男子內結七疝皆積寒於小腸之間所致也非大熱劑
即不能愈遂制一方名之曰沉香桂附丸每服百丸空
心溫酒吞下間服天台烏藥散旬日良愈明年秋王征

班師即遠迎拜精神如故上大悅輒錄於此

沉香桂附丸

治中氣虛弱脾胃虛寒飲食不美退陰

助陽除臟腑積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷鳴面色不澤手足厥逆便利無度又治下焦陽虛及療七疝痛引小腹不可忍腰曲不能伸喜熱熨稍緩

沉香

附子

炮製去皮臍

川烏頭

炮去皮臍切作小塊

乾姜

炮

右為細末好醋煮糊丸梧桐子大每服五十丸至七八十丸熱米飲湯送下空心食前日二服忌冷物

金鈴子丸

出朱氏集驗方

治膀胱小腸疝氣臍腹苦痛

茴香

川楝子

半兩每個四片用巴豆四十粒炒焦為度不用巴豆

破故

紙

葫蘆巴

炒各二兩

右為細末酒糊丸每三十丸細嚼胡桃仁三個熟葱

酒送下常服鹽酒吞下亦可

金鈴子散

出朱氏集驗方

治膀胱疝氣小腸偏墜小腸撮痛發

則欲死諸藥所不治妙方

川楝子

一兩淨

班貓

十四個去頭足翅

巴豆

十四個去壳并心擘開作兩片

右二味同煉於銀石瓦器內慢火炒令川楝肉帶肉微黃焦色取去班猫巴豆二藥不用只將川楝子肉別安之一處外用茴香三錢重和前川楝子肉用鹽合炒令香并前川楝子研為細末每服三錢空心溫酒調下若臟腑微利通即愈病久而甚痛者不過三服病退即止服此方之後仍用安腎丸沉香華澄茄散吞服以補其虛則其病永不作矣

燒綿丸

出朱氏家藏方

治疝氣

川楝子

去核

馬蘭花

青橘皮

舶上茴香

各一兩

右為細末用漆丸如鷄頭大針穿三孔陰乾用新綿半兩燒成灰細研以無灰酒調綿灰稀稠得所溫放下藥一丸正發未時皆可食之藥在伏中不壞如要取藥時可飲葵湯即下淨洗留之一丸藥可治六七人神效

天雄沉香煎丸

出王氏博濟方

治下元虛憊陽事不能成下墜

及小腸氣痛腎臟攻注脾胃不和腰脚重

天雄

四兩生用研判

防風

二兩生

紫黑小豆

二兩淨生用

漢椒

四兩

附子

四兩生

草烏頭

四兩生

牛漆

二兩

天麻

二兩已上八味以無灰酒

一斗放銀鍋內煨火不得令大沸酒浸為度焙令乾

沉香

丁香

木香

羌活

乾姜

各一兩

官桂

一兩去皮

肉蓯蓉

三兩酒浸去土炙熟

紫

巴戟

二兩去心

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每日空心下二十丸

加三十丸久服明目雄氣海駐顏

葫蘆巴丸

出鮑氏方

治大人小兒小腸氣盤腸氣奔豚疝氣

偏墜陰腫小腸有形如卵上下痛不可忍或絞結繞
臍嘔吐悶亂

葫蘆巴

一斤 大巴戟

六兩
并炒

右為末酒糊丸如梧桐子大每服十五丸空心酒鹽
湯下○一方加青皮蓬朮桃仁黑牽牛破故紙○一
方加川棟破故紙茴香川烏蜜丸酒下

方

三茱丸

出楊氏
家藏方

治膀胱疝氣時發痛疼而不除漸至堅

大此藥可以內消

山茱萸

吳茱萸

湯浸七遍

食茱萸

青橘皮

去白

茴香

微炒

肉桂

去皮

金鈴子

去核

陳皮

去白

木香

各等分

右件為細末酒煮麵糊為丸梧桐子大硃砂為衣每服三十丸酒或鹽湯送下食前

木香丸

出楊氏家藏方

治膀胱寒疝腫緩疼痛

地蟾蟲

去頭翅足

斑猫

去頭翅足

紅娘子

去頭翅足

巴豆

四味共等分以

糯米一盞同炒

川棟子

去核炒

川椒

去目及閉口者各一兩

茴香

二兩鹽炒

木香

半兩

右件同糯米細末木瓜肉四兩猪腰子一對去筋膜
同和酒二升熬爛研成膏和前藥末和丸梧桐子大
每服三十丸鹽湯或溫酒送下空食前

猪胞丸

出楊氏家藏方

治膀胱疝氣腫大牽引作痛

猪胞

一枚酒煮切

甘遂

澤瀉

二味共二錢炒

黑牽牛

續隨

子

去壳半兩

木猪苓

班猫

用鹽米炒黃去米并頭足翅稱一錢

右件為細末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服三十丸

嚼茅香酒送下取動小便如米泔是效嘗服五十七

丸忌甘草三日食前

澤瀉散

出楊氏家藏方

治膀胱疝氣小腸氣痛

馬蘭花

川楝子肉

炒

茯苓皮

澤瀉

茴香

炒

麥門冬

去心

石燕子

煨

紅醋

淬七次

右件各等分為細末入麝香少許每服一錢用鹽酒

調下空心臨卧

茴香散

出楊氏家藏方

治一切氣疾臍腹滿膀胱疝氣小腸氣

痛

荆三棱

炮切

蓬莪朮

炮切

金鈴子

去核

麩炒赤

三味共一兩

茴香

炒

青橘皮

去白

甘草

炙二味

各半兩

木香

當歸

洗焙

二味

各一分

右件為細末每服二錢水一盞生姜二片煎至七分溫服如小腸撮痛炒生姜酒調下如人行五七里再服一服空心食前

療疝氣

出本草

右以蜎皮燒為灰酒服之

治疝積腹痛

出本草

右以羚羊角作末服之

除疝瘕

出本草

右以雀卵白和天雄兔系子末為丸空心酒下五丸



普濟方卷二百四十七

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百四十八

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣范來宗

謄錄監生臣江 晉

欽定四庫全書

普濟方卷二百四十八

明

周王朱櫛 撰

癰疽門

心疝

附論

夫疝者痛也由陰陽氣積于內寒氣不散上衝心故使
用痛謂之心疝也其痛也或如錐刀所刺或陰陰而疼
或四肢逆冷或唇口變青皆其候也○內經謂診得心
脉而急疾名心疝少腹當有形也心為牡臟小腸為之

使故曰小腹當有形也夫臟病必傳於腑今心不受邪病傳於腑故小腸受之為疝而痛當有形也世之醫者以疝為寒濕之疾不知心氣之厥亦能為疝心疝者當兼心氣以治之

方

牡丹丸 治心疝心痛如錐所刺

牡丹皮

桂皮

芍藥

烏頭

皮炮去

細辛

甘草

炙

木香

吳茱萸

湯浸焙炒

檳榔

各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下不拘

時

赤芍藥丸

出聖惠方

治心疝心腹中如錐刺疼痛脇下脹滿

赤芍藥

去蘆

桔梗

去蘆頭

細辛

桂心

川椒

去目及閉口微

炒出汗

乾姜

炮製剉

附子

炮製去皮臍

木香

檳榔

各一兩

右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服以熱

酒下三十九丸日四五服

木香散 治心疝心痛不可忍

木香

羌活

去蘆頭

檳榔

生剉

牡丹皮

當歸

切炒桂皮去

青橘皮

湯浸去白皮炒

蓬莪朮

煨各一兩

右為散每服二錢沸湯或溫酒調下不拘時

蓬莪散

治心疝痛肢體虛冷

蓬朮

煨

檳榔

生剉

附子

炮製去皮臍

甘草

剉

桂

去麤皮

胡椒

半兩 芳馨

白朮

各三分

右為末每服二錢水一盞煎七分溫服不拘時

桃仁丸

出聖惠方

治心疝心痛四肢逆冷面色青黑

桃仁

湯浸去皮尖
仁麩炒微黃

沒藥

安息香

乳香

麝

香

細研

桂心

木香

吳茱萸

湯浸七遍焙乾
微炒各一分

右為末都研令勻用蒸餅和丸如小豆大不拘時以

少酒嚼下二十九

治心疝心腹中如錐刀所刺疼痛

出聖
惠方

巴豆

木香

檳榔

各半
兩

附子

去皮臍
生用

川烏頭

去皮

臍生用
共一兩 乾漆

搗碎炒
令煙盡

桃仁

湯浸去皮尖
雙仁麩炒黃

蓬莪茂

各三

分

右件藥先以巴豆附子烏頭等三味以水煮一日久
取出各去皮巴豆去心膜一處搗如泥諸藥別搗羅
為末相和巴豆等分入醋麵糊丸菴豆大不拘時醋
湯下五丸

芍藥丸 治心疝心脇痛及繞臍痛

芍藥

桔梗

去蘆

細辛

去苗

蜀椒

去目閉口

桂心

去乾姜

炮共

附子

炮製去皮

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫酒或鹽

飲不拘時

木香散 治心疝心脇痛及繞臍痛

芍藥

桔梗

去蘆頭

細辛

去苗葉

蜀椒

去目閉口炒去汗

桂皮

乾姜

各五分

附子

炮去皮臍一兩

牡丹丸 治疝氣心腹痛

牡丹

桂心

川烏頭

炮製去皮臍

木香

吳茱萸

湯浸

七 檳榔

各一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如菉豆大每服以溫

酒服十九日四五服

硃砂丸 治心疝心腹中疔刺疼痛不可忍

硃砂

細研半兩

桂心

半兩

桃仁

湯浸去皮尖及

仁麩炒黃半兩

附子

炮製

去皮

臍一兩

麝香

半錢細研

巴豆

二十一枚

去皮

心研紙煨去油

右為末麵糊和丸如梧桐子大每服醋湯下二丸

治心疝發作有時激痛難忍者

以麝茵吳茱萸等分搗末蜜丸如麻子大每服二

丸日三服勿熱食一方以茱萸一升麝茵如彈子

大服一丸合搗以鷄子白和丸如小豆大服二丸
即止

紫桂丸 治陰交攻心疝疼痛

桂

去粗皮
半兩

當歸

焙三分

吳茱萸

湯洗焙
一兩

右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸炒生
姜鹽酒下米飲亦得日三服

治心疝心腹內攻刺疼痛腹脇虛脹宿食不消或時吐
逆少思飲食

硃砂

細研水飛過

半夏

湯洗七次去滑共一兩

川烏頭

半兩去皮臍生用

右為細末醋煮麵糊和丸如小豆大不拘時以生姜

橘皮湯下

三溫散 治心疝冷痛不可忍

附子

炮製去皮臍

蓬莪茂

煨剉各一兩

右為散每服一錢匕熱酒調下不拘時婦人醋湯下

治三十年心疝神效方

射干

半兩

吳茱萸

二兩湯浸七次焙乾微炒

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服五丸以粥飲下日
三服藥勢欲盡乃可喫熟食良

木香散 治心疝小腹痛悶已絕者

木香 陳皮 各一兩 良姜 乾姜 訶子皮 赤芍

藥 枳實 各半兩 草豆蔻 川芎 黑牽牛 各三錢

右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

厥疝 附論

夫內經謂脉黃之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣

名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風夫疝臟疾言隱而難見陰沉而伏也今脾虛風寒客於膜腹之間不能興通行水穀之氣結而成積使氣道厥而通故謂之厥疝

方

懷香丸 治厥疝上攻腹痛無時

懷香子

炒

吳茱萸

酒浸焙乾炒

桂

去粗皮

胡椒

棟實

剉碎

炒

延胡索

各半兩

蜚蠊

去翅足炒

海蛤

芫花

醋炒焦

硃砂

研
木香 共一兩

右為末酒煮麵糊和丸梧桐子大每服十丸鹽酒下

食前

山茱萸丸 治厥疝上搶心腹冷痛

山茱萸

吳茱萸

湯洗焙乾

食茱萸

揀實

剉碎麩炒

馬蘭

花 懷香子

焙

青橘皮

湯浸去白焙

陳橘皮

湯浸去白焙

乾

姜 炮

荊三棱

炮各三兩

附子

一枚重兩半者炮製去皮臍

右為末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸酒

或鹽湯下空心服

細辛丸 治厥疝冷逆攻心腹痛

細辛

去苗葉

芍藥

吳茱萸

湯浸焙乾炒

人參

白朮

桂

去粗皮

乾姜

炮

甘草

炙

當歸

切

附子

炮製去皮臍各一兩

右為末稀麵糊丸梧桐子大空心米飲下三十丸日

三服

木香湯 治厥疝逆上攻心腹冷痛

木香

檳榔

生剉

烏頭

炮製去皮臍

細辛

去苗葉

當歸

切

吳

焙

黃

茱萸

湯浸焙乾炒

枳殼

去瓢麩炒

甘草

炙各一兩

右咬咀如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫

服不拘時

吳茱萸湯

出宣明論

治厥疝腹中陰冷痛積氣上逆

吳茱萸

湯洗焙乾炒二兩

烏頭

炮製去臍皮

細辛

去苗葉各三分

當歸

焙切

高良姜

剉炒

乾姜

炮

桂

去粗皮各一兩

右剉如麻豆大每服五錢水三錢煎一盞去滓溫服

日三

當歸乾姜湯 治厥疝腹中冷痛

當歸

切焙

乾姜

炮

附子

炮製去

皮臍

人參

甘草

炙

細辛

去苗

芍藥

各一兩

葉

右㕮咀如麻豆每服三錢水一盞煎七分去滓溫服

不拘時

卒疝

附論

夫卒疝者腎臟虛弱之人形寒飲冷暴受邪氣傳入經脈蓋是少陰腎經與太陽膀胱二經合為表裏卒然感

寒熱相傳則津脉不得流通氣道結澁而腸滿攻臍腹
牽引於陰暴發疼痛或曰汗出悶絕不省難可堪忍故
卒疰也

方

懷香煮散 治卒疰攻小腸疼痛

懷香子

炒

枳壳

去穢
麩炒

木香

芍藥

厚朴

去粗皮
生薑汗

炙 陳皮

桂

去粗
皮

青橘皮

湯浸去
白焙

乾姜

炮製

人參

白茯苓

去黑
皮

荆三棱

各半
兩

生地黄

焙三
分

右為散每服三錢七水一盞葱白二寸鹽少許煎七分熱服

木香丸 治卒疝腹痛不可忍

木香

桂

去粗皮

檳榔

剉

蓬莪朮

煨

懷香子

炒

桃仁

去皮尖双仁
研膏共三分

萊菔子

炒

青橘皮

湯浸去白
焙各半兩

厚朴

去粗

皮生薑汁
炙一兩

右將八味搗羅為末入桃仁膏和勻酒煮麵糊丸梧桐子大每服二十丸空心溫酒下食前

茱萸湯 治卒疝攻臍腹痛汗出悶絕

吳茱萸

湯浸焙乾炒半兩

細辛

去苗葉

附子

炮製去皮臍

人參

白茯苓

去黑皮桂

去粗皮半夏

生薑汁製乾

當歸

右咬咀如麻豆每服三錢水一盞生薑一片大棗二

枚擘破煎七分去滓溫服不拘時

乾姜湯 治卒疝繞臍腹卒暴疼痛

乾姜

炮製

白茯苓

去黑皮

椒

去目并閉口炒出汗

附子

炮製去皮臍

桂

去粗皮

芍藥

當歸

切乾

芍藥

一兩

右呔咀如麻豆每服二錢水一盞煎七分去滓溫服
不拘時

蜀椒散 治卒疝心痛如刺繞臍腹中盡痛自汗出氣
欲死方出本門寒疝心腹痛類

姜朮散 治卒疝少腹中相引疼痛不可忍

蒼朮 米泔浸切炒 乾姜 炮製 馬蘭花 芫花 醋炒焦 五靈脂

去烏頭 炮製去皮 臍各一兩

右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服十丸食前溫

酒或鹽湯下

當歸湯 治卒疝心腹痛裏急

當歸

焙

生姜

芍藥

各二兩

羊肉

切去脂膜半斤

右將三味細切先以水五升煮羊肉爛熟去肉以汁煮藥候熟去滓澄清每服一盞不拘時

走馬湯

出聖惠方

治卒疝無故心煩腹痛陰縮手足厥逆并

治飛尸氣擊有尸癰兼治中惡心痛腹脹大便不通

巴豆

三個去皮心炒

杏仁

三個去皮心炒

右味綿纏搥令碎熟湯二合捻取白汁飲之當下老
少量與服之尤妙療鬼擊有尸癰者當蓄此藥用驗
忌野猪肉蘆笋等物

寒疝

夫寒疝為病陰冷內積胃氣不行結於腹內故遇寒則
發其狀惡寒不欲食手足冷繞臍痛自汗出遇寒則發
其脉弦緊是也○疝之為病隨臟氣虛實感傷外邪寒
泣風散暑鬱濕着絞刺擊搏無有定處倉卒之際痛不

堪忍世人稱為橫弦堅弦膀胱小腸氣賊風入腹等名義不同症狀則一寒則溫之風則散之暑則利之濕則燥之各有成法

方

四製茱萸香煉丹

出德生堂方

專治小腸疝氣陽事衰敗下

元虛冷效

吳茱萸

一兩分作四分 酒浸煮一分 醋浸去膜一分 裝猪尿胞帶尿者

便浸

一

澤瀉

四兩

川楝子

四十九個 已豆二

枳壳

分鹽炒

去黏炒

木香

陳皮

青皮

茴香

鹽炒

石菖蒲

炒 枳

榔

三稜

煨

桃仁

去尖炒

草薢

蓬朮

煨

官桂

白

茯苓

乳香

共三兩別研

荔枝核

四十枚

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心

鹽湯或酒下常服辟除邪氣食前空心服治腎經虛

弱寒腫痛諸種疝氣

具茱萸湯

出聖惠方

治寒疝腰腹痛胸中冷氣上搶心脇支滿

不得卧面目痛風寒悸悼多驚不能飲食已即嘔寒

熱往來

吳茱萸

湯浸七遍
焙乾微焙

半夏

浸七次
去滓

乾姜

炮裂
剉

人參

去
蘆

頭

當歸

剉碎
微炒

赤芍藥

各三
分

細辛

紫苑

去苗
土

附子

炮裂
去皮

熟乾地黄

前胡

去蘆
頭

赤茯苓

白朮

桂

心

木香

各一
兩

甘草

炙微
剉

旋復花

各半
兩

訶黎勒

一
兩

半用
皮

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不拘時

生姜湯下二十丸

補腎湯

出醫方集成

治寒疝入腹上實下虛小腸疼痛時復

泄瀉胃膈痞滿不進飲食常服溫脾補腎

人參 茯苓

白朮 黃耆

附子

炮製去皮
臍各一兩

沉

香木瓜

四錢 一兩半

羌活

半兩

甘草

炙

芫花

各一分

紫蘗

三錢

右為末每服三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分去

滓食前服嘔加半夏半兩添水作盞半姜七片煎

治脇下風氣作塊寒疝發則連小腹痛湊心其積名屬
肝在右脇下故病發則右邊手足頭面昏痛不思飲食

止頭痛

乾葛

一兩

麻黃

三分

側子

一個

川芎

防風

枳實

芍

藥

桂枝

羌活

甘草

當歸

各四錢

右為末每服四錢水一盞半姜三片同煎七分去滓

通口服日三四服有汗避風

木香湯方

治寒疝攻注膏脇滿痛汗出

木香

三分

檳榔

剉

細辛

去苗葉

赤茯苓

去黑皮

人參

芍

藥

當歸

切

桂

去粗皮

前胡

去蘆頭

青橘皮

湯浸去白焙已上各

一
兩

右為散每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

茱萸內消丸

出和
刺方

治腎與膀胱經虛為邪氣所搏結成

寒疝伏留不去臍腹疔痛刺小腸氣奔豚瘕癰痛不
可忍陰核偏成大膚囊癰腫結硬牽急重大滋長癰
癢疼痛時黃水瘡癢腰腿沉重足脛腫滿行步艱難
累經治療不見減瘥服之漸漸內消不動大腸亦不
搜絞補虛消疝溫養腎經此藥不熱無毒若至心服

餌其效如神

吳茱萸

湯浸七次焙

陳皮

去白

川楝子

蒸去皮核

肉桂

去粗皮

馬蘭花

醋炙

青皮

去白

山藥

焙

茴香

炒

山茱萸

去核共二兩

木香

一兩不見火

右為末酒糊丸梧桐子大每服三十丸至五十丸空

心溫酒或鹽湯吞下

桂心丸

治寒疝胸脇支滿食飲不化臍腹疼痛及嘔

痢風痙瘳項強急不得俛仰

桂

去粗皮五分

吳茱萸

湯浸焙乾炒三兩

白薇

一兩

烏頭 防葵

各半兩

蜀椒

去目及閉口者炒

白芷

各三分

乾姜

炮

芫蕘

各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸溫酒下食前

一方忌生葱猪肉冷水

茴香丸

出儒門事親書

治冷氣攻刺疝氣疼痛腎虛脚弱

茴香

八兩炒

川楝子

炒

川烏

炮去臍皮

葳靈仙

洗去土

防風

去蘆 陳皮

各三兩

地龍

一兩去土微炒

烏藥

五分

赤小豆

八兩

右為末酒糊為丸每服三五丸茶酒下

蓬莪朮湯

治寒疝四肢冷逆氣弱汗出

蓬莪朮

炮

附子

炮製去皮臍

桂

去粗皮

檳榔

芍藥

各一兩

芎藭

白朮

共三分

乾姜

半兩炮

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分去滓溫服

不拘時

人參湯

治寒疝冷痛氣弱汗出不欲食

人參

白茯苓

去黑皮共一兩

蜀椒

去目及閉口者炒出汗

乾姜

炮半

兩

附子

炮製去皮臍

檳榔

白朮

青皮

湯浸去白焙共一兩

右判如麻豆大每服三錢水一盞煎七分去滓溫服

三增茴香丸

出危氏方

治腎與膀胱俱虛為邪氣搏結遂成

寒疝伏留不散臍腹痛陰核偏大膚囊癰腫重墜滋
長有妨行步療瘡不止時行黃水浸成瘡癢或長怪
肉累治不痊致令腎經閉結陰陽不通外腎腫脹冷
硬如石漸硬大皆由頓服熱藥內攻或因兜取以至
如此此藥溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝暖疝養腎
經能使復元氣應小腸氣寒疝之疾久新不過三料

第一料

舶上茴香

用海鹽半兩
炒黃和鹽稱

川楝子

炮去核

沙參
洗
木香

洗各

一兩

右為細末煮米粉稠糊丸如梧桐子大每服二十丸
溫酒鹽湯空心日進三服小病此一料可安才盡便
可服第二料

第二料 加下項藥

萆撥

一兩
五錢
檳榔

右入前藥共六味重五兩半細末依前法糊丸湯使
丸數服之若病大未愈便服第三料

第三料 又加下項藥

白茯苓

四兩 緊小者去黑皮

黑附子

半兩 炮去皮
稱或作一兩

右通前藥八味重十兩並依前法糊丸湯使丸數服
之加至三十丸新久大病不過此三料可愈小腸氣
發頻及三十年者寒疝氣至拷桺大者皆可消散神
效

生料木香勻氣散

出危氏方

治寒疝作痛和氣

丁香

檀香

木香

共一兩

甘草

燼四兩

硝砂

二兩去壳

白

荳蔻仁

沉香

共一兩

藶合香

去皮土四兩

右剉散每服二錢水一盞半生姜三片紫藶葉五錢

食鹽少許煎熱服不拘時或為末炒茴香鹽酒調亦

可

茱萸湯

治寒疝來腰腹攻痛

吳茱萸

湯浸焙炒三分

生姜

切焙微炒

鼓

微炒

桂

去粗皮共半兩

右為散每服三錢水一盞酒少許同煎七分去滓溫服

治虛人老人寒疝作痛不可攻刺

出澹療方

右以木香調氣散煎炒茴香鹽酒調下一法呿咀
每服二錢水一大盞生姜紫蘓鹽煎服尤妙立有
效驗

又方 治下部冷及臍下小腹痛不可忍一服效

赤石脂

乾姜

各十兩

右為末麵糊為丸如豌豆大每服十丸至二十丸空
心米飲下日三服

紫蘓子丸

治臟氣疝腹痛

紫蘓子

揀淨

陳橘皮

去白共一兩

高良姜

桂

人參

共半

兩木香

一分炮

右為末煉蜜丸如芡實大如丸服細嚼米飲下小兒
白湯化下一丸霍亂吐瀉急服煎藿香湯下尤妙

高良姜湯 治寒卒痛積聚不散上衝心腹與陰相引

痛則出汗

高良姜

炒

檳榔

半大升

右和暖灌下部少間即減日一度再灌之即止

大烏頭桂枝湯

出濟生方

治風寒疝氣中痛逆冷手足不仁

身體疼痛灸刺諸藥不能療及賊風入腹攻刺五臟拘急不得轉側作叫呼陰縮悉主之

大烏頭

五枚實者去皮尖蜜一大匙煎減半傾出湯切洗

桂心

芍藥

各三

錢三

甘草

一分炙

右剉散每服四大錢水一盞半生姜五片大棗三個
入前煎烏蜜半合同煎七分盞去滓食前服一法用
附子一個不使烏頭為蜜附湯

茴香小佳酒

指出直
指方

治腎冷疝氣偏墜急痛

舶上茴香

三錢

胡椒

一錢

縮砂仁

辣桂

各二錢

右為末以生雀燎毛去腸拭淨洗用三個入藥於其
腹中麻繩繫定濕紙數重裹煨香熟空心嚼食溫酒
送下

治寒疝來去每發絞痛

出肘後方

附子

一枚 椒三百粒

半夏

十個 乾姜十兩

右大棗三十枚粳米一升水七升煮米熟去渣一服

一升令盡

牡丹丸

方見本門諸疝類

治寒疝心腹刺痛休作無時及治婦

人月病血刺疼痛

烏頭湯

治寒疝手足逆冷身體疼痛冷汗自出

烏頭

炮製去皮臍二兩

桂

去粗皮一兩

細辛

去苗葉三分

右剉如麻豆每服三錢水一盞煎七分去滓溫服

牡丹丸 治寒疝來去疼痛冷汗自出

牡丹皮

桂

去粗皮
共二兩

烏頭

炮製去皮
臍二枚

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服二十九丸溫酒送下

空心日午卧時服

木香丸 治寒疝繞臍痛結硬不消

木香

附子

炮製去皮臍

硃砂

飛研各
一兩

右為細末煮麵糊和丸如梧桐子大每服三十丸溫

酒下空心食前

姜桂丸 治腎冷寒疝

良姜

半兩切片

巴豆肉

二十一粒截斷同炒焦去巴豆

桂心

半兩

右為末醋麵糊丸梧桐子大每服三十丸溫酒食前服

烏頭湯 治寒疝滿逆手足不溫偏身疼痛灸刺諸藥

不能治一名烏頭桂枝湯

烏頭

實大者三枚去皮臍生切

白蜜

一斤

桂

去粗皮二兩

右先以慢火煎蜜及烏頭候蜜減半瀝出烏頭別就
一處以水三盞煮桂候減半瀝出桂將桂汁并煎蜜
汁共和別煎取二盞許服半盞溫服未知再服其知
如醉伏得吐為中病也外臺云以水二升半煮桂取
一升以桂汁和蜜煎合煎之得一升許服又云范注
方以桂枝湯烏頭煎服

治寒疝腹痛飲食下難不覺其流行方

半夏 生姜

各半升

桂

八兩

右水二升煮取一升分三服

治寒疝來去每發絞痛方

吳茱萸

三兩

生姜

四兩

豉

二合

右酒四升煮二升分為二服

又方

出肘後方

牡蠣

甘草

官桂

各二兩

右水五升煮取一升半再服

備急方

治臟寒氣疝腹疼

沉香 木香

右以水磨濃又傾小蓋內逐旋磨及一服許煎數沸
即服無不作效

治寒疝腹痛飲食不下喉中噎塞

川椒

去目及閉口者微炒去汗

乾姜

炮製剉

桂心

各半兩

右為散水三大蓋煮取二蓋去渣內牽牛子末一兩
又煎一蓋三分去滓分溫三服

倉卒散 治寒疝入腹心腹卒痛及小腸膀胱氣疝刺

脾腎氣攻擊急極痛不可忍屈伸不能腹中冷熏如石自汗出一名奪命散

山梔子

四十九個
燒半過

附子

一枚
炮

右剉散每服二錢水一盞酒半盞鹽一捻溫服即愈暑症香薷散加瞿麥木通每服四錢食鹽少許煎服如外腎痛者用川椒半兩白麵二匙以鹽水和作餅子裹之仍用絹綿包定乾即再用鹽水搜和再用立效治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食

用桂心二兩去皮搗羅為散不計時熱酒調下一

錢

大烏頭湯 治寒疝繞臍苦痛發即自汗手足厥寒其

脉沉弦

用烏頭十五枚熬黑不切水三升煮取一升去滓
內蜜二升煎令水氣盡得二升強人服七合羸人
五合一服未效明日更服

療疝瘕冷氣方

用採鼠李子日乾九蒸九曝酒浸服三合日兩服
漸加三服能下血及內積滯物

治寒疝小腹及陰中相引痛自汗出欲死

用丹參一兩杵為散每服熱酒調下二錢七住時
後用沙參

療寒疝不能食

取馬蘭子一斤每日取胡桃許以麵拌熟煮吞之
然後依常飯日再服服盡必愈一除腹內一切諸

疾消食肥肌仍時燒磚熱以殺羊毛作毡裹却毡
上熨之日一度尤佳

治寒疝來去每發絞痛

出肘
後方

用宿烏雞一頭治如食法生地黃七斤合細剉之
著甌篲中蒸同器盛湏取汁清旦服日補令盡其
間當下諸寒癖訖作白粥漸食之久疝者下三劑
愈

治寒疝來去每發腹中疴痛

出聖
惠方

吳茱萸

半兩湯浸七次焙乾微炒

桂心

一兩

右為散每服二錢水一鍾煎六分去滓食前溫服

寒疝心腹痛

附論

夫疝者痛也本由寒氣內積陽衰陰盛寒邪不散因而攻擊或冷氣搶心或腹內疝刺發即俱痛故名寒疝心腹痛也

寒疝心腹痛者由陰氣積結所生也陰氣不散則寒氣盛寒氣盛則痛上下無常言冷氣上衝於心故令心痛

也

方

吳茱萸丸 治寒疝心腹痛或逆搶心煩滿不得卧惡

風驚惕不食亦發寒熱

吳茱萸

湯洗焙炒一兩

細辛

去苗葉

芍藥

柴胡

去苗

旋復花

黃芩

去黑心

紫苑

去苗土

人參

白朮

乾姜

炮

白

茯苓

去黑皮

桂

去粗皮

附子

炮製去皮臍

甘草

炙

半夏

浸洗七次

滑當歸

切焙共一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸至三十丸溫酒下不拘時

吳茱萸丸 治寒疝心腹痛面目青黃不下飲食縱食

嘔逆

吳茱萸

湯浸七次焙乾微炒

赤茯苓

乾姜

炮製

甘草

炙微

各半

白朮

前胡

去蘆頭

桂心

赤芍藥

半夏

湯浸

七次去滑

當歸

剉微炒

川椒

去目及開口微炒去汗

陳橘皮

湯浸去皮槌焙

附子

炮製去皮臍

人參

去蘆頭

木香

共一兩

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服
以生姜下二十九日四五服

當歸湯 治寒疝心痛及諸虛冷氣滿悶

當歸

剉微炒

乾姜

炮製剉

甘草

炙微赤剉共半兩

黃耆

剉

人參

去蘆

川椒

去目及閉口微炒去汗

半夏

湯洗七次去滑

青橘皮

湯浸去白

棗

附子

炮裂去皮臍共一兩

厚朴

二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

桂心

半兩

右為散每服三錢水一中盞生姜半分煎六分去滓

不拘時稍熱服

瓜子散

出聖惠方

治寒疝胃脇支滿飲食不下寒中心腹痛

及吐痢背項強急不得俛仰

甜瓜子

微炒

桂心

白芷

芎藭

川烏頭

木香

當歸

剉碎微炒
共一兩

白薇

川椒

去目及閉口者微炒去汗

乾姜

炮製

剉

吳茱萸

湯浸七次
焙乾微炒

防葵

各半兩

右為細末和搗三二百杵如梧桐子大每服生薑湯

下二十九日四五服

七熬飯後丸

療手足熱腹中寒疝不能飲食數心腹

痛

茯苓

五兩

乾姜

六兩 令焙
共十二兩

大黃

二斤

柴胡

十兩

芎藭

七兩

葶

麤子

一升

蜀椒

一兩 炒
出汗

芒硝

一升 重十兩
減五兩

杏仁

一升 去
皮尖 雙

仁

加桂心

五兩

附子

三兩

右藥乾姜茯苓不熬餘皆熬搗篩以蜜和丸梧桐子
大每服七丸日三忌猪肉冷水醋物生葱等

木香散

出聖
惠方

治寒疝心痛悶絕

木香

一兩

高良姜

剉

赤芍藥

赤茯苓

乾姜

炮製
剉

陳橘皮

湯浸去白穰焙

訶黎勒

煨用皮

枳壳

麩炒微黃去穰共半兩

芎

翦

草豆蔻

去皮

牽牛子

微炒共三兩

右為散每服三錢水一中盞生姜半分煎六分去滓

不拘時稍熱服

白朮丸

出聖惠方

治寒疝心腹痛四肢不和面色青冷不欲

飲食氣漸羸弱

白朮

一兩

青橘皮

湯浸去白穰焙

厚朴

去粗皮塗生姜汁炙令香熟

桂心

附子

炮製去皮臍

草豆蔻

去皮共一兩

乾姜

炮製

當歸

芳藟

木香

共半兩

山芋子

三分

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如桐子大每服不拘時熱酒下三十丸

吳茱萸丸

治虛冷痰癖疝食不消心腹痛氣弱欲食

虛憊羸瘦

吳茱萸

烏頭

炮共十兩

紫苑

白薇

共三分

桂心

六兩

前

胡芍藥

細辛

芳藟

黃芩

共五分

右為散蜜和酒服如梧子大五丸日三稍加之忌猪

肉冷水桃李生葱菜等

人參湯 治寒疝心腹痛胸脇支滿不下食汗出嘔逆

人參

白茯苓

去黑皮

栝榔

剉

木香

芍藥

芎藭

當歸

切焙

桂

去粗皮

青橘皮

湯浸去白焙共一兩

右為散每服三錢水一鍾煎七分去滓溫服不拘時

芎藭丸

出聖惠方

治寒疝心腹疼痛膏脇支滿飲食不下

芎藭

一兩 川椒

一兩半去目及閉口者微炒出汗

防葵

白薇

桂

心 白朮

吳茱萸

湯浸七次焙乾微炒

乾姜

炮製剉

川烏頭

炮裂去皮
臍共一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服生
姜橘皮湯下三十丸日四五服

柴胡湯 治寒疝心腹痛

柴胡

去苗
四兩

大棗

去核焙
六枚

黃芩

去心

人參

甘草

炙
剉半

夏

湯浸去滑
生薑汁炒

桂

去粗
皮

芍藥

共一
兩

右為散每服三錢水一盞生薑一片煎七分去滓溫
服不拘時

木香散

出聖惠方

治寒疝心腹脅脇支滿不能下食

木香

三分

檳榔

赤茯苓

人參

去蘆頭

當歸

剉碎微炒

桂

心

前胡

去蘆頭

青橘皮

湯浸去白穰各一兩

右為散每服四錢水一鍾生姜半分棗三枚煎六分去滓不拘時稍熱服

蜀椒湯

主寒疝氣心痛如刺繞臍腹中盡痛自汗出

欲絕夫疝者痛也陰氣積結所生也陰氣不散則寒氣盛寒氣盛則痛上下無常言冷氣上衝於心故冷

心痛也

蜀椒

二百枚
出汗

附子

一枚
炮

乾姜

半兩

半夏

十二枚
洗

大棗

十二

一枚
擘 粳豆

一升

甘草

一兩
炙

右切以水七升煮取三升澄清熱服一升不瘥更服

一升用以療心腹痛差效困急欲死逐結寒上下痛

良忌猪羊肉錫海藻菰菜

地黄湯 治寒疝心腹痛汗出厥冷

生地黃

焙三兩

甘草

炙

白茯苓

去黑心

人參

當歸

焙切

二 羊肉 去脂切

兩 三斤

右前五味細剉將羊肉用水二斗煮取一斗去羊肉入諸藥煮取七升入葱白一把切棗十四枚擘破再煮六升絞去滓每溫服一盞不拘時

蜀椒散

出聖惠方

治寒疝心痛如刺絞臍腹盡痛自汗出氣

欲絕方

川椒

一分去目及閉口者微炒去汗

附子

一個炮製去皮臍

乾姜

炮製剉桂

心

共半兩

半夏

湯浸七次去滑

甘草

炙微赤

右為散每服三錢以水一中盞入粳米半合生姜半
分棗一枚煎六分去滓不拘時稍熱服一方無粳米

治寒疝心痛四肢冷逆不欲食

出聖
惠方

蓬莪茂

附子

炮製去
皮臍

桂心

共一
兩

胡椒

半
兩

芳藟

白朮

共二
分

右為散不拘時以熱酒調下一錢

當歸散

出聖
惠方

治寒疝心腹痛不下飲食痛甚引脇肋間

及腹裏急者

當歸

剉碎炒

乾姜

炮製剉

白朮

陳橘皮

湯浸去白穢焙

羊肉

半斤細切

萆薢

半兩

右件藥除羊肉外為散以水三大盞合煮取兩大盞

半去滓不拘時稍熱服一小盞

椒附散

出聖惠方

治寒疝心腹痛如刺不下飲食自汗出氣

欲絕

川椒

去目及閉口者微炒出汗

乾姜

炮製剉共半兩

附子

炮製去皮臍

枳櫚

白朮

青橘皮

湯浸去白穢共一兩

右為散每服三錢水一中盞入生姜半分棗三枚煎六分去滓不拘時稍熱服

高良姜羊肉湯

出聖惠方

治寒疝心腹痛及脇肋裏急不下

飲食

高良姜

剉

赤芍藥

剉

當歸

剉微炒

桂心

共一兩

羊肉

一斤

半細切

右件除羊肉外為散水五大盞合煮取兩盞半去滓不拘時稍熱服一小盞

附子丸 療寒疝下牽小腹心腹痛

附子

二兩炮
去皮

桃仁

三兩去皮
尖及仁熬

蒺藜子

一升去
角尖熬

右為末蜜和丸如梧子大空心酒下十丸漸加十五

丸及二十丸日再服忌生菜熱麵炙肉笋蒜猪魚

治寒疝心腹痛四肢逆冷不欲食

出聖
惠方

高良姜

劉當歸

劉微桂心

各一
兩

右為細末不拘時熱酒送下一錢

當歸湯

出金
匱方

治寒疝心腹痛裏急

當歸

切三兩

生姜

切五兩

羊肉

去脂膜切作片一斤

右以水一斗煮取五升去滓每服一盞不拘時日三夜二若寒多者加生姜切一斤痛多而嘔者加橘皮二兩白朮一兩加生姜者亦加水五升煮取三升二合服之

治寒疝心腹脇引痛諸藥不可近者

出本草

以烏頭五枚大者去芒角及皮四破以白蜜一升煎令透潤取出焙乾搗篩又以熟蜜丸冷鹽湯吞

下二十丸如梧子永除又法用煎烏頭蜜汁以桂枝湯五合解之飲三合不知加五合其知者如醉者以為中病

寒疝積聚

附論

夫積聚者由寒氣在內所生也血氣虛弱風邪搏於腑臟寒多則氣澁而生積聚也積者陰氣五臟所生如發不離其部故上下有所窮也聚者陽氣六腑所成也故無根本上下無所留心但諸臟腑受邪初未能為積聚邪

氣留滯不去乃成積聚其為病也或左右脇下如覆杯
或臍上下如臂或胃管間覆大如盤羸瘦少氣或洒淅
寒熱四肢不收飲食不為肌膚或累累如桃李或腹滿
嘔泄寒則痛故云寒疝積聚也其脉駛而緊積聚浮而
牢積聚牢強急者生虛弱急者死也

方

續命散

一名食
茱萸散

治寒疝積聚邪氣往來厥逆搶心痛羸

瘦少氣胸脇滿不嗜食

食茱萸

二兩

芍藥

細辛

去苗葉

前胡

去蘆頭各一兩一分

乾姜

炮

烏頭

炮裂去皮臍各二兩半

紫苑

去苗葉

黃芩

去黑心

白朮

白薇

芫薺

人參

生乾地黄

焙各一兩一分方用熟地黄

蜀椒

去目及閉桂口炒出汗各二兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服七丸米飲或溫酒下食前服一方無黃芩有當歸忌生冷油膩滑物

桂心湯

治寒疝積聚心腹疼痛結塊不消

桂

去粗皮

大黃

畧炮皮

桔梗

剉炒皮

附子

剉製去皮臍

木香

白

朮

當歸

切焙

枳榔

赤芍藥

各一兩

芎藭

高良姜

剉炒

枳實

去穢麤炒
共半兩

右㕮咀如麻豆每服三錢水一鍾煎七分去滓溫酒服不拘時

芫花丸

出聖惠方

治寒疝積聚動搖大者如鼈小者如杯乍

來乍去在於胃管大腸不通風寒則腸鳴心下寒氣上搶胸脇支滿

芫花

二兩醋拌炒令乾

椒目

川大黃

剉碎微炒

細辛

川烏

頭炮製去皮臍

赤芍藥

赤茯苓

桂心

木香各一兩

半夏

湯洗七遍去滑

桔梗

去蘆頭

吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒各半兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以溫酒下七丸日三服當下如泥其病即愈

鼈甲湯

治寒疝積聚心腹結痛飲食不下

鼈甲

醋炙去裙襴

荆三稜

炮剉

大黃

剉炒各一兩

當歸

切焙去

木

赤芍藥

木香

枳殼

去瓢麩炒

訶梨勒

炮去皮

栴榔

各半兩剉

右為散每服三錢水一盞生姜三片煎七分去滓溫服不拘時候

桔梗丸 治寒疝邪氣往來堅固積聚不散多寒不得臥苦汗出大小便不利

桔梗剉炒 藜蘆

去蘆頭炙各半兩

葶藶子

紙上熬

厚朴

去麋皮生薑汁

塗炭剉

附子

去皮臍炮裂各一兩一分

人參

沙參

桂

去麋皮各三分

杏仁

去皮尖双仁炒五十枚

特生礬石

一兩燒半日許

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸或七丸米

飲或溫酒下日三

桔梗丸

出聖惠方

治心腹牢強寒疝邪氣往來堅固積聚苦

寒煩悶不得眠臥夜苦汗出大便堅小便不利食不

生肌

桔梗

去蘆頭

甜葶藶

微炒令香

藜蘆

去蘆頭微炙

桂心

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙令香

附子

炮製去皮臍

當歸

剉微炒

鼈甲

塗醋炙微

黃去裙襴

川大黃

剉碎微炒各一兩

杏仁

五十枚湯浸去皮尖及仁麤炒微黃

右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每於食

前溫酒下十五丸

栝榔湯 治寒疝積聚結塊攻注心腹脹滿

栝榔

生剉

芫薺

桔梗

剉炒

當歸

切焙

桂

去麋皮

赤芍藥

白朮

木香

各半兩

大黃

剉碎微炒一兩

右為散每服二錢七水一盞煎六分去滓溫服不拘

時

木香湯 治寒疝積聚來去攻擊疼痛不欲飲食

木香

訶梨勒皮

炮

栝榔

剉

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙

青橘

皮

湯浸去白
焙各半兩

赤茯苓

去黑皮
三分

白朮

人參

桂

去
麋

皮各

一分

右為散每服三錢水一盞生姜三片煎七分去滓溫

服不拘時

鼈甲丸

出聖
惠方

治寒疝積聚固結不通繞臍切痛腹中脹

滿風入五臟憂患所積用力不節筋脉勞傷羸瘦不

能飲食

鼈甲

一兩塗醋炙
微黃去裙襴

甘草

炙微
赤剉

甜葶藶

微炒
令香

桂心

川烏頭

炮製去皮臍

川大黃

剉碎微炒

芳藟

赤芍藥

枳

榔

各半兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食

前生姜橘皮湯下二十丸

白朮湯 治寒疝凝結積聚不散攻注腹內疼痛不下

飲食

白朮

二兩

赤茯苓

去黑皮

枳殼

去瓢麩炒

人參

桔梗

剉桂炒

去蘆皮

荆三稜

炮製

枳榔

剉各一兩

右為散每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

栴榔湯 治寒疝積聚胸腹堅急脹滿不飲食

栴榔

生剉

桃仁

去皮尖
雙仁炒

郁李仁

炒去
皮

木香

荊三稜

炮各桂
皮去麤
一兩

青橘皮

湯浸去白
焙各半兩

右為散每服三錢水一盞生姜三片煎七分去滓溫

服不拘時候

附子丸 治寒疝冷心腹積聚繞臍切痛飲食不下

附子

炮製去
皮臍

吳茱萸

湯浸七遍
焙乾微炒

細辛

藁本

川

烏頭

炮裂去皮臍

檳榔

各一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以

燒酒下二十丸日三四服

懷香子丸

一名香橘散

治寒疝積聚臍腹疼痛兩脇脹滿及

一切冷氣刺痛皆治

懷香子

炒

檳榔

炮

荊三稜

炮

青橘皮

湯浸去白鹽炒黃各半兩

木香

一分

右為散每服二錢入鹽少許沸湯點服不拘時

香鼓丸 療積年腹內宿結疝冷氣及諸癖癥等

香美爛鼓

曝乾微蒸
令香即止

小芥子

揀去土石微熬令
疝即止各一升

右為末煉蜜丸空腹酒服二十丸漸加至三十丸日
二服初服半劑以來腹中微繞痛勿怪之是此藥攻
病之候

陰疝

附論

黃帝鍼經曰足厥陰之脉環陰器抵小腹是動則病丈
夫癰疝即陰疝也嗜慾傷腎水涸竭無以滋榮肝氣故

留滯內結發為陰疝之病也世俗論陰疝者為腎餘氣殊不知邪實又本於肝經也治法宜瀉邪氣之實補肝經之虛

方

昆布丸 治陰疝腫大偏墜

昆布

洗去鹹炙

海藻

洗去鹹炙

蒺藜子

炒去角

蕪荑仁

炒

栝榔

剉各一兩半

枳殼

去瓢麤炒

大麻仁

研各二兩

木香

黃耆

剉訶

梨勒

炮去核各三分

陳橘皮

去白炒

桃仁

去皮尖雙仁炒研

鬼絲子

酒浸一宿別

搗各一兩

右為末和勻煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心

食前溫酒或鹽湯下

葫蘆巴煮散 治陰疝攻痛

葫蘆巴 沉香 馬蘭花 蓬莪茂 煨 懷香子 炒

半兩 棟實 取肉 木香 姜黃 檳榔 剉 桂 去麋皮 附

子 炮製去皮 甘草 炙 臍 三分 兩

右為散每服三錢水半盞煎七分空心食前和滓溫

服

葫蘆巴丸

治陰疝氣攻疼痛

葫蘆巴

補骨脂

白豆蔻

去皮

青橘皮

去白焙

草薢

懷香子

炒

附子

炮製去

肉蓯蓉

酒浸

牛膝

酒浸

切焙

切焙

切焙

切焙

桂

去蘆皮

防風

去蘆

兔絲子

酒浸搗

各一兩

右為末酒煮麵糊為丸如菰豆大每服二十九空心

生姜鹽湯下

桃仁湯

治陰疝牽引小腹痛

桃仁

去皮尖
雙仁炒

吳茱萸

湯洗焙
乾炒

陳橘皮

去白
切焙桂皮去麤

海藻

湯洗去鹹
炙各一兩

白茯苓

去黑
皮

羌活

去蘆
頭

蒺藜子

炒
去

角各一
兩半

檳榔

十枚
剉

右為散每服五錢水一盞半生姜五片煎八分去滓

溫服不拘時

川烏頭丸

出聖
惠方

治陰疝積聚繞臍腹痛飲食不下

川烏頭

炮製去
皮臍

荆三稜

煨
剉

桂心

木香

郁李仁

湯洗去微
剉各一兩

吳茱萸

湯浸七遍
焙乾微炒

細辛

甘草

炙微
赤剉藁

本

各半
兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服二
十丸生姜湯下

川烏頭散 治陰疝腹腰痛手足逆冷身體疼痛針灸
諸藥所不能任者

川烏頭

十枚炮製
去皮臍

桂枝

二兩

右為散每服二錢水一盞生姜半分煎五分下蜜半
合更煎三沸令熱食前和滓溫服

椒附丸

治陰疝腫痛上攻臍腹

蜀椒

去目并開口
炒出汗一兩

附子

炮製去
皮臍

桂皮

去麤

巴戟天

去心

桃仁

去皮尖双
仁炒研

芫薺

當歸

切炒各
半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心日午

夜臥溫酒下

木香丸

治陰疝急脹疼痛外腫

木香

陳橘皮

去白
炒

萊菔子

炒

青橘皮

去白
炒

桂

去麤

皮各
一兩

牽牛子

炒二
兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下以利為度

二氣丸 治陰疝上而不下臍腹疼痛

石硫黃

研

黑鉛

各一兩

右先以鉛於銚內鎔成汁次下硫黃炒煙焰透移下候冷取出研為細末糯米糊丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下

蒺藜湯

出衛生寶鑑

治陰疝牽引小腹痛諸厥疝即陰疝也

嘻欲勞痛不可忍之

蒺藜子

炒去角

附子

炮製去皮臍

山梔子仁

各一兩

右㕮咀如麻豆每服五錢水一盞半煎八分去滓食前溫服控羣證苗香陳實丸亦治

沙參散

治陰疝牽引疼痛

沙參

一兩半

桂

去麋皮半兩

桃仁

四十九枚尖雙仁炒研

去皮

右為散每服二十丸溫酒調下不拘時

應痛丸

治陰疝撮痛不可忍者

韭子炒 芎藭

右等分為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心

溫酒下

陰疝腫縮

附論

夫陰疝腫縮者寒邪客於厥陰之經而陽氣不能自溫故令諸筋拘急陰器緊縮而腫痛也肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡於舌本脉不榮即筋縮急則引卵與舌故舌卷卵縮者皆厥陰為病也

方

礪砂丸 治陰疝腫縮疼痛

礪砂

研

木香

各半兩

棟實

去核炒

懷香子

炒

荆三稜

各

一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心酒下

消腎丸 治下部腎囊脹腫擊攻疼痛

牽牛

半斤取頭末四兩二兩炒熟二兩生用

香附子

淨一兩半兩炒半兩生用

破

故紙

一兩半兩炒半兩生用

青木香

一兩半兩炒半兩生用

川棟子

半兩

半炒半

生用

右為細末用大蒜二十箇半煨半生爛搗三五百下
丸如梧桐子大每服五十丸空心葱鹽湯下取大便
三二行不利再加如利大減忌濕麵

狼毒丸 治陰疝腫縮疼痛氣欲絕

狼毒

炙二兩

防葵

炮

附子

炮製去皮
臍各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸溫酒下空心

日午臨臥服

黃連丸 治陰疝腫縮

黃連

去

熟艾

炙

杏仁

去皮尖白
研各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸用鹽湯下

空心服

萬苴熨方 治陰疝腫縮疼痛

萬苴

切半
斤

皂莢

剉碎
三挺

蜀椒

去目及閉口者
炒出汗一兩

右三味少用水煮令相得不可太稀乘熱用布三兩

重裹熨腫處冷即易頻熨自消

雄黃洗方 治陰疝腫縮痛人所不能忍及陰腫大如

斗核痛者

雄黃

研

甘草

各一兩

礬石

研二兩

右為末每用藥一兩熟湯五升通手洗腫處良久再

煖洗至冷候汗出瘥

集驗方無礬石只二味

雞翅灰散 治陰疝腫縮

雞翅

左右俱用不限多少燒灰

以細研為散每服二錢溫酒調下不拘時

槐子丸 治陰疝腫縮

槐子

炒一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下空心服

蔓菁散塗方 治陰疝腫縮

蔓菁根

不拘多少判碎

右為散溫水調塗腫處或以絹帛敷之以瘥為度

車前子塗方 治陰疝腫縮

車前子

不拘多少

右為末湯調塗腫處一方酒調服之

狼毒丸 治男子陰久卒縮入腹急痛欲死名陰疝

狼毒

四兩

防風

二兩

附子

三兩

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三丸日夜三度

治男子陰疝

右用槐白皮煎淋浴

普濟方卷二百四十八